

後遺症難評估 專家：須長期治療

防止虐待兒童會總幹事何愛珠認為事件嚴重，相信女童的身體及心理都受到嚴重影響。她指兒童應在有愛的環境成長，一般嚴重受虐兒童，可能覺得自己不受歡迎、不被愛，影響自我觀感，對人的信任、與人的關係較弱，但目前仍難評估該名女童的受影響後遺症程度，但相信屬嚴重程度，須長期接受治療，包括很多心理上的支援及輔導等。

何愛珠續稱，嚴重的虐兒個案其實可以避免，希望任何人，包括鄰居、朋友及親友等，懷疑有虐兒個案時，應立刻代小朋友求助，以免小朋友受到嚴重的傷害。而今次事件當局應繼續跟進調查為何有社工跟進的家庭，竟無法及時察覺女童受虐，包括當獲通知女童會被安排往內地時，有沒有跟進了解實際情況等。

年紀小時間長 受虐傷害愈大

社署臨床心理學家林玉葉則表示，兒童受虐時年紀愈小、時間愈長，施虐者與兒童的關係愈親密，對兒童的創傷會愈深遠。她說，受虐兒童一般成長速度會較同年小朋友慢、身體較瘦弱，甚至拒絕生長，外國過去有研究發現，部分受虐兒童的腦部及中央神經發展會出現障礙，對部分感覺有偏差反應，出現自虐行為，長大後較易有暴力傾向，或有濫藥酗酒行為。林玉葉指出，目擊父母虐待兄弟姊妹的兒童，心理亦有機會出現不安，在成長過程中遇到困難，會較傾向重複暴力行為。

醫生：皮膚潰爛染細菌易惡性循環

兒科醫生馮宜亮認為，女童身體出現潰爛情況，或與她長期營養不良有關。他指，營養不良會造成一系列的問題，包括影響細胞的製造，令傷口癒合較慢、抵抗力弱，亦會令腦部發展及骨骼發展較遲緩，造成心臟衰弱，精神不集中，情緒低落等。女童亦會因為飢餓，肌肉不發達，缺乏力氣等因素被逼長期臥床，加上抵抗力差，容易有皮膚潰爛，如再受細菌感染，在缺乏治療及本身身體對抗細菌能力下，情況會日漸嚴重，並造成一個惡性循環。

兒科醫生陳以誠亦表示，一般正常的7歲女童，在面對虐待或飢餓問題時，會哭鬧及作出反抗，鄰居或會得悉女童求救，故不排除女童本身有其他病患或智力缺陷等，以致需由幼稚園讀起及長期臥床，而長期臥床會造成爛瘡、潰爛及肌肉萎縮等問題。 ■記者 杜法祖

Reference:

<http://paper.wenweipo.com/2015/09/09/HK1509090006.htm>